

## Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων

Εξεταζόμενο Μάθημα: Χημεία Θετικών Σπουδών,

Ημερομηνία: 6 Ιουνίου 2024

Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων

### ΘΕΜΑ Α

- A1. Σωστή απάντηση το β.
- A2. Σωστή απάντηση το α.
- A3. Σωστή απάντηση το α.
- A4. Σωστή απάντηση το δ.
- A5.



- 1. Σωστό
- 2. Σωστό
- 3. Λάθος
- 4. Λάθος
- 5. Σωστό



### ΘΕΜΑ Β

#### B1.

α. Η ηλεκτρονιακή δομή σε υποστιβάδες των στοιχείων στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:




β. Το στοιχείο X βρίσκεται στον p τομέα, 3<sup>η</sup> περίοδο και ομάδα 18 (ή VIII A).

Το στοιχείο Ψ βρίσκεται στον s τομέα, 4<sup>η</sup> περίοδο και ομάδα 1 (ή IA).

γ. Σωστή απάντηση το (ii).

Οι ατομικοί αριθμοί που δίνονται αφορούν διαδοχικά στοιχεία στον περιοδικό πίνακα. Στο διάγραμμα παρατηρούμε πως το στοιχείο  $\Sigma_3$  έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια 1<sup>ου</sup> ιοντισμού ενώ το διαδοχικό στον Περιοδικό Πίνακα,  $\Sigma_4$ , έχει πολύ μικρότερη. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το  $\Sigma_3$  είναι ευγενές αέριο, καθώς σε μια περίοδο η ενέργεια του 1<sup>ου</sup> ιοντισμού αυξάνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά και το  $\Sigma_4$  είναι το πρώτο στοιχείο της επόμενης περιόδου.

B2. α. Αν τοποθετηθεί το  $CoCl_2$  σε δοχείο με υγρασία ( $H_2O$ ), τότε εξαιτίας της αποκατάστασης της Χημικής Ισορροπίας:



Το χρώμα θα μεταβληθεί από μπλε σε ροδόχρουν. Συνεπώς, με την αλλαγή του χρώματος είναι δυνατός ο προσδιορισμός ύπαρξης νερού (υγρασίας).

β. Με βάση την αρχή Le Chatelier η ισορροπία μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση εκείνη που τείνει να αναιρέσει την έξωθεν επιβαλλόμενη μεταβολή.

# ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Συνεπώς, με αύξηση της θερμοκρασίας ευνοείται η ενδόθερμη αντίδραση. Αφού το χρώμα γίνεται μπλε, η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά. Άρα προς τα δεξιά η αντίδραση είναι εξώθερμη, συνεπώς ισχύει ότι  $\Delta H < 0$ .

## B3.

- α.  ${}^3Li: 1s^2 2s^1$  ανήκει στη 2<sup>η</sup> περίοδο 1<sup>η</sup> ομάδα (1<sup>ο</sup> αλκαλίο). Συνεπώς η ένωση  $LiH$  (υδρίδιο του λιθίου) είναι ιοντική, γεγονός που εξηγεί το πολύ υψηλό σημείο ζέσεως της.
- β. Το σημείο ζέσεως εξαρτάται από την ισχύ των διαμοριακών δυνάμεων. Το  $HF$  σχηματίζει ισχυρούς δεσμούς  $H$ , ενώ στα  $HBr$ ,  $HCl$  κυριαρχούν δυνάμεις διπόλου-διπόλου. Συνεπώς, λόγω της αυξημένης ισχύος των δεσμών υδρογόνου το  $HF$  έχει πιο υψηλό σημείο βρασμού από τα υπόλοιπα υδραλογόνα.
- γ. Η ισχύς των δυνάμεων διπόλου-διπόλου αυξάνεται με την αύξηση της σχετικής μοριακής μάζας ( $Mr$ ) της ένωσης. Συνεπώς αφού  $Mr_{HBr} > Mr_{HCl}$  στο  $HBr$  εμφανίζονται ισχυρότερες δυνάμεις διπόλου-διπόλου, άρα έχει μεγαλύτερο σημείο ζέσεως από το  $HCl$ .

B4. Στο σχήμα φαίνεται ότι σε θερμοκρασία  $T_1$ , το πλήθος των μορίων που έχει μεγαλύτερη κινητική ενέργεια από την ενέργεια ενεργοποίησης  $Ea$  (άρα θα μπορέσει να δώσει περισσότερες αποτελεσματικές συγκρούσεις) είναι μεγαλύτερο από το πλήθος σε θερμοκρασία  $T_2$ . Άρα, η ισχύει ότι:  $T_1 > T_2$ .


## ΘΕΜΑ Γ

### Γ1.


- α. Οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων είναι:

(Α)	$CH_2 = O$
(Β)	$CH_3OH$
(Γ)	$CH_3Cl$
(Δ)	$CH_3MgCl$
(Ε)	$CH_3CH_2OH$
(Θ)	$CH_3COOH$
(Κ)	$CH_3COONa$
(Ζ)	$CH_2 = CH_2$
(Λ) ή (Μ)	$CHBr_3$
(Μ) ή (Λ)	$HCOOK$

β. Η χρήση του απόλυτου αιθέρα στην αντίδραση παρασκευής αντιδραστηρίου *Grignard* είναι αναγκαία, καθώς η ύπαρξη έστω και μικρής ποσότητας  $H_2O$  θα οδηγήσει σε καταστροφή του αντιδραστηρίου *Grignard* σύμφωνα με την εξίσωση:



**Γ2. α.** Η χημική εξίσωση του πολυμερισμού είναι:




**β.** Γενικά ισχύει:  $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ , οπότε για το πολυμερές θα είναι:


$$P \cdot V = \frac{1}{v} \cdot R \cdot T \Rightarrow v = \frac{R \cdot T}{P \cdot V} = \frac{0,082 \cdot 300}{0,0246 \cdot 1} = \frac{24,6}{0,0246} = 1000$$

**γ.**


**Μονομερές:**



Είναι:



**Πολυμερές:**



Είναι:



**Γ3. α.**

$mol$	$x_{(s)}$	$+ 2\Psi_{(g)}$	$\rightarrow \Omega_{(g)}$
$Aρχ.$	$\omega$	0,6	—
$Αντ./ Παρ.$	$y$	$2y$	$y$
$t_1$	$\omega - y$	$0,6 - 2y$	$y$

Δίνεται ότι τη χρονική στιγμή  $t_1$  η ποσότητα του  $\Omega$  είναι  $0,1 \text{ mol}$ , άρα  $y = 0,1 \text{ mol}$ . Επομένως, τη στιγμή  $t_1$  στο δοχείο η συγκέντρωση του αερίου  $\Psi$  είναι:

$$[\Psi] = \frac{0,6 - 2y \text{ mol}}{2 \text{ L}} = \frac{0,6 - 0,2}{2} \text{ M} = 0,2 \text{ M}$$

Αφού πρόκειται για απλή αντίδραση, ο νόμος της ταχύτητας είναι  $v = k[\Psi]^2$  και η στιγμιαία ταχύτητα την  $t_1$  είναι:

$$v = 10^{-3} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \cdot (0,2 \text{ M})^2 = 4 \cdot 10^{-5} \text{ M} \cdot \text{s}^{-1}$$

**β.** Η σχέση που συνδέει τη στιγμιαία ταχύτητα κατανάλωσης του  $\Psi$ ,  $v_\Psi$  με τη στιγμιαία ταχύτητα είναι:

$$v = \frac{1}{2} v_\Psi \Rightarrow v_\Psi = 2v = 2 \cdot 4 \cdot 10^{-5} M^{-1} \cdot s^{-1} = 8 \cdot 10^{-5} M^{-1} \cdot s^{-1}$$

**γ.** Τη χρονική στιγμή  $t_2$  δίνεται πως ολοκληρώνεται η αντίδραση και πως στο δοχείο περιέχονται 0,4 mol αερίων. Επομένως, το αέριο  $\psi$  πρέπει να βρίσκεται σε περίσσεια.

mol	$x_{(s)}$	+	$2\Psi_{(g)}$	$\rightarrow$	$\Omega_{(g)}$
Αρχ.	$\omega$		0,6	—	
Αντ./Παρ.	$\omega$		2 $\omega$	$\omega$	
$t_2$ τελ	—		0,6 – 2 $\omega$	$\omega$	

$$\text{Τη στιγμή } t_2, n_{O\Lambda_{AEPLOY}} = 0,4 \text{ mol} \Rightarrow 0,6 - 2\omega + \omega = 0,4 \Rightarrow \omega = 0,2 \text{ mol}$$

Επομένως, τη χρονική στιγμή  $t_2$  το στερεό  $X$  έχει αντιδράσει πλήρως και στο δοχείο περιέχονται:  $0,6 - 2\omega = 0,2 \text{ mol } \Psi$  και  $0,2 \text{ mol } \Omega$ .

**Παρατήρηση:** Εάν θεωρήσουμε πως το στερεό  $X$  βρίσκεται σε περίσσεια, τότε θα αντιδρούσαν πλήρως 0,6 mol  $\Psi$  και θα παράγονταν 0,3 mol  $\Omega$ , άρα τη στιγμή  $t_2$  στο δοχείο το σύνολο των αερίων μορίων θα ήταν 0,3 mol που είναι άτοπο με βάση τα δεδομένα της εκφώνησης.

## ΘΕΜΑ Δ

**Δ1.** Έστω  $c_1$  και  $c_2$ , η συγκέντρωση του  $CH_3COOH$  και  $HCOOH$  στο διάλυμα και  $ka_1, ka_2$  αντίστοιχα οι σταθερές ιοντισμού των οξέων. Έχουμε:

Molarity	$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$		
αρχ.	$c_1$		
αντ/παρ.	$x$	$x$	$x$
τελικά	$c_1 - x$	$x$	$x$

Molarity	$HCOOH + H_2O \rightleftharpoons HC O^- + H_3O^+$		
αρχ.	$c_2$		
αντ/παρ.	$y$	$y$	$y$
τελικά	$c_2 - y$	$y$	$y$

Ισχύει:  $[H_3O^+] = x + y$  και

$$ka_1 = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{x(x+y)}{c_1 - x} \cong \frac{x(x+y)}{c_1} \Rightarrow ka_1 \cdot c_1 = x(x+y), \quad (1)$$

Αντίστοιχα:

$$ka_2 = \frac{[HCOO^-][H_3O^+]}{[HCOOH]} = \frac{y(x+y)}{c_2 - y} \cong \frac{y(x+y)}{c_2} \Rightarrow ka_2 \cdot c_2 = y(x+y), \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις (1) και (2) προκύπτει:

$$(x+y)^2 = ka_1 \cdot c_1 + ka_2 \cdot c_2 \Rightarrow (x+y) = \sqrt{ka_1 \cdot c_1 + ka_2 \cdot c_2}$$

$$\Rightarrow (x+y) = \sqrt{10^{-5} \cdot 1 + 0,8 \cdot 10^{-4}}$$

$$\Rightarrow (x+y) = \sqrt{9 \cdot 10^{-5}}$$

$$\Rightarrow (x+y) = 3 \cdot 10^{-2,5} M$$

$$\text{Άρα, } [H_3O^+] = 3 \cdot 10^{-2,5} M.$$

**Δ2.** Αρχικά υπολογίζουμε την αναλογία όγκων με την οποία θα πρέπει να αναμειχθούν τα δύο διαλύματα, προκειμένου να προκύψει  $P\Delta$  με  $pH = 9$ . Έστω  $V_1 L$  και  $V_2 L$  ο όγκος του  $\gamma_1$  και  $\gamma_2$ , που αναμειγνύονται.

$$n_{NH_3} = C_1 V_1 = 0,5 V_1 mol \quad \text{και} \quad n_{HBr} = C_2 V_2 = 1 V_2 = V_2 mol$$

Η χημική εξίσωση της αντίδρασης εξουδετέρωσης είναι:

mol	$NH_3$	+	$HBr$	$\rightarrow$	$NH_4Br$
Αρχ.		0,5 $V_1$	$V_2$	—	
Αντ./ Παρ.		$V_2$	$V_2$	$V_2$	
$t_1$	$0,5V_1 - V_2$	—	—	$V_2$	

Προφανώς για να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα θα περισσέψει  $NH_3$  (ασθενής βάση), οπότε θα αντιδράσει όλο το  $HBr$ .



$$\text{Στο ρυθμιστικό διάλυμα: } C_{NH_3} = \frac{0,5V_1 - V_2}{V_1 + V_2} \text{ και } C_{NH_4Br} = \frac{V_2}{V_1 + V_2} \text{ ισχύει: } [OH^-] = Kb \frac{C_{NH_3}}{C_{NH_4^+}}$$

με αντικατάσταση έχουμε:


$$10^{-5} = 10^{-5} \cdot \frac{0,5V_1 - V_2}{V_2} \Leftrightarrow 0,5V_1 - V_2 = V_2 \Leftrightarrow 0,5V_1 = 2V_2 \Leftrightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{4}{1}$$

ο μέγιστος όγκος θα προκύψει αν πάρουμε 100 mL ( $\gamma_1$ ) και 25 mL( $\gamma_2$ ) άρα ο ζητούμενος όγκος είναι 125 mL.


**Δ3. α.** Έστω  $n mol$  καθαρό θείο στο δείγμα των 10 g οπότε παραγονται  $n mol SO_2$ .



τα συνολικά mol NaOH είναι  $mol_{o\lambda} = C \cdot V = 0,5 \cdot 2 = 1$



$2n \text{ mol}$     $2n \text{ mol}$



$$\text{Άρα: } 2n + 2n = 1 \Leftrightarrow n = \frac{1}{4}$$

β. Είναι:  $m_s = n \cdot Ar = \frac{1}{4} \cdot 32 = 8g$


Σε 10g δείγματος περιέχονται 8g καθαρό θείο άρα 80% w/w.

γ. Το τελικό διάλυμα περιέχει τα άλατα  $NaCl$  και  $Na_2SO_4$  με συγκεντρώσεις έστω  $C_1$  και  $C_2$  αντίστοιχα.

Molarity	$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$
αρχ.	$C_1$
τελικά	$C_1 \quad C_1$

$Na^+ + H_2O \rightleftharpoons$  και  $Cl^- + H_2O \rightleftharpoons$  Δεν αντιδρούν με  $H_2O$ , καθώς προέρχονται από την ισχυρή βάση  $NaOH$  και το ισχυρό οξύ  $HCl$  αντίστοιχα.

Molarity	$Na_2SO_4 \rightarrow 2Na^+ + SO_4^{2-}$
αρχ.	$C_2$
τελικά	$2C_2 \quad C_2$



και  $HSO_4^- + H_2O \rightleftharpoons$

Επομένως, το διάλυμα είναι βασικό.

Επιμέλεια: Μπάμπης Μπέσης, Χαλίδα Μάρω, Παύλος Μπέσης-Λαζάρου

### Υπολογισμός Μορίων Πανελλαδικών 2024



Χρησιμοποιήστε την Εφαρμογή για να **υπολογίσετε Μόρια**  
για κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα / Σχολή!

**Υπολογίστε Μόρια**, δείτε τα **Τμήματα Επιτυχίας** (με τις περσινές βάσεις), τις **Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής** για κάθε Ειδικό Μάθημα  
και για κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα  
μέσα από την [ιστοσελίδα](#) του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ  
ή την Android Εφαρμογή: [mobile app](#)